

Le courlis corlieu

Mise à jour le 12 septembre
2023

Nom latin : *Numenius phaeopus*

En France, le Courlis corlieu est un oiseau essentiellement de passage, au printemps en avril-mai et à l'automne, avec un maximum en août-septembre.





Le Courlis corlieu a la tête coiffée d'une petite calotte brun noirâtre, avec une ligne médiane longitudinale très claire, et les sourcils blancs. Les parties supérieures sont brun foncé, avec des stries et des taches claires. Le croupion est blanc, finissant en pointe au milieu du dos. Les couvertures subcaudales sont blanches, barrées de brun. La queue est grise, avec des lisières presque blanches, rayée transversalement de brun foncé. Le courlis corlieu mesure généralement entre 40 et 50 cm de longueur, avec une envergure d'environ 80 à 90 cm.

Espèce holarctique et nordique, le Courlis corlieu niche dans le nord de l'Europe (Scandinavie, Finlande, Russie, Islande, les îles Féroé, l'Ecosse), en Sibérie et en Amérique du Nord. Il niche en colonies. Il revient sur les aires de nidification de mi avril à mai. Le nid est au sol, dans un endroit dégagé, dans une dépression peu profonde.

En migration, on le trouve sur les zones humides, les côtes, et les prairies sèches ou humides.

Il s'agit d'une espèce particulièrement sensible au dérangement. Une étude menée en baie de Somme a montré que le courlis corlieu présente la plus grande distance de fuite parmi les espèces observées, avec une moyenne de 167 mètres.

Il hiverne en Afrique du Sud, au sud de l'Asie, mais aussi parfois sur les côtes espagnoles. En hiver, il est essentiellement côtier, occupant les récifs exposés, les plages, les vasières et les mangroves.

Son régime alimentaire est très varié. Ils consomment des invertébrés marins, des crustacés, en particulier des crabes, des vers marins et des mollusques. Ils capturent également des poissons. Sur les lieux de nidification, ces oiseaux se nourrissent de gros insectes, de baies et occasionnellement de fleurs.

A l'échelle nationale, le stationnement des migrateurs est de plus en plus compromis par la disparition des prairies humides. Le courlis corlieu fréquente la baie de Saint-Brieuc lors de sa migration pré-nuptial en avril-mai et lors de sa migration post-nuptial de juillet à octobre. C'est un oiseau très sociable pendant la migration, formant de grands groupes pouvant compter plusieurs centaines d'individus. Plus de 200 individus peuvent faire une halte en baie.

CORLIEU VS CENDRÉ

Plus petit que le Courlis cendré, il se reconnaît à son bec arqué plus court, à son bandeau oculaire clair, et à sa raie médiane crème au-dessus de la tête.



Courlis corlieu



Courlis cendré

