

Chevalier aboyeur Com.Greenshank

Tringa nebularia

ordre : Charadriiformes

famille : Scolopacidés



Statut de l'espèce :

Directive oiseaux : **annexe II/2**

Convention de Berne : **annexe III**

Convention de Bonn : **accord AEWA (1999), annexe II**

Protection nationale : **chassable**

Liste rouge UICN : **préoccupation mineure**

Liste rouge nationale : **préoccupation mineure**

Liste rouge régionale : -

Quelques chiffres :

Effectif en Europe :

330 000

Hivernant en France :

371

Effectif moyen en BSB :

4

Importance du site :

nationale (1.1%)

Les observations de Chevalier aboyeur se distribuent sur la quasi-totalité de l'année en petits effectifs allant de quelques un à une vingtaine individus. A noter cependant 57 individus en août 2020 qui demeurent l'observation la plus importante de l'espèce sur le site. Si quelques oiseaux sont présents en hivernage et au printemps, les observations les plus importantes se réalisent en été à l'occasion de la migration postnuptiale jusque au début de l'automne.

La première observation à la mi-janvier date de 2000 (13 individus). 4 individus hivernent en moyenne sur le site sur la dernière décennie avec une présence régulière et croissante depuis 2012. Au cours de l'hiver 2021/2022, 6 individus en moyenne ont hiverné en baie. Les données issues des comptages mensuels confirment cette tendance à l'augmentation sur les mois d'hiver et à l'échelle de l'ensemble de l'année.

Cette augmentation locale des effectifs peut s'expliquer par une augmentation des effectifs hivernants l'échelle nationale à la mi-janvier de 10.1% en moyenne par an sur la période 1980-2013 pour 449 individus en moyenne sur la période 2009-2013 (Quaintenne *et al.*, 2015).

En Côtes d'Armor, le Chevalier aboyeur est un migrateur et un hivernant peu commun localisés sur certains secteurs littoraux. Le département accueille une population hivernante d'importance nationale avec 38 individus observés en moyenne sur la période 2000-2009 (GEOCA, 2014).

La population reproductrice européenne est considérée comme stable à positive en fonction des zones considérées. Les effectifs européens incluant la Russie sont compris entre 338 000 et 609 000 couples (Stroud *et al.*, 2004 ; Bird Life International, 2004).

Effectifs hivernants :

moy. 1970-2022 : 4

moy. 1995-2004 : 3

moy. 2005-2014 : 3

moy. 2015-2022 : 4

moy.max : 6 (21/22)

Effectifs annuels :

moy. 1970-2022 : 4

moy. 1995-2004 : 4

moy. 2005-2014 : 4

moy. 2015-2022 : 5

moy.max : 9 (2008)

Tendances

Europe :

70 → 08 ↗ 22

nationale :

70 → 95 ↗ 22

Baie de Saint-Brieuc :

82 → 14 ↗ 22

source :

Wetlands International




Birdlife

RNN Baie de Saint-Brieuc

Chevalier aboyeur



Tringa nebularia

Evolution des effectifs du Chevalier aboyeur en baie de Saint-Brieuc au cours de l'année.
Tendance sur la période 1970-2022.
 (non figuré une donnée de 244 ind. en juillet 2008)



Indice de variation des effectifs calculé à partir des données Wetlands National et en baie de Saint-Brieuc.
 (L'indice 1 est fixé par la moyenne des effectifs sur la période 2000-2021).

Evolution des effectifs du Chevalier aboyeur en baie de Saint-Brieuc pour la période 1982-2022, à partir des données des comptages Wetlands effectués à la mi-janvier.



Evolution des effectifs moyens du Chevalier aboyeur en baie de Saint-Brieuc pour la période 1996-2022, établie à partir des données des comptages mensuels.