

Vanneau huppé Northern Lapwing

Vanellus vanellus

ordre : Charadriiformes

famille : Charadriidés

Statut de l'espèce :

Directive oiseaux : **annexe II/2**

Convention de Berne : **annexe III**

Convention de Bonn : **accord AEWA (1999), annexe II**

Protection nationale : **chassable**

Liste rouge UICN : **vulnérable**

Liste rouge : **préoccupation mineure**

Liste rouge régionale : **données insuffisantes**



Quelques chiffres :

Hivernant en Europe :

2 800 000

Hivernant en France :

107 159

Hivernant en BSB :

947

Importance :

nationale (1%)

Responsabilité biologique régionale :
élevée

Le Vanneau huppé est présent de novembre à février en fond de baie de Saint-Brieuc. Quelques rares observations ont été signalées à d'autres périodes.

Les courbes d'évolution d'effectifs montrent de fortes fluctuations interannuelles avec des pics d'abondance parfois très élevés: 8000 individus en 1996, 2500 en 2014. Les effectifs sont stables depuis la fin des années 1990/début 2000 sur l'ensemble des jeux de données analysés.

Bien que de petits groupes de Vanneau huppé soient régulièrement présents sur le secteur de Bourienne, la fréquentation de l'espèce est très irrégulière en fond de baie. En fonction des aléas climatiques, d'une part, et des conditions de gel des terrains agricoles situés en périphérie, d'autre part, les effectifs présents peuvent fortement varier. Contrairement à d'autres espèces pour lesquelles le fond de baie constitue le principal site d'hivernage, pour le Vanneau huppé, il semblerait que le fond de baie intègre un complexe plus vaste comprenant les terres agricoles alentour et que sa fréquentation se réalise au gré des mouvements erratiques d'individus présents sur une zone plus large. Si on peut affirmer que la présence de l'espèce est stable et régulière sur le site, il faut toutefois se garder d'interpréter trop hâtivement les fluctuations interannuelles d'effectifs. La même utilisation du site est observée chez le Pluvier doré, les deux partageant souvent les mêmes reposoirs.

La population européenne rassemble de 5 100 000 à 8 400 000 d'individus (BirdLife International, 2012 ; Thorup, 2006). Les effectifs sont considérés en déclin (Hagemeijer et Blair, 1997 ; BirdLife International, 2021), et l'espèce est considérée comme vulnérable en Europe en raison d'une chute conséquente de ses effectifs depuis une quarantaine d'année (BirdLife International, 2021).

Effectifs hivernants :

moy. 1970-2022 : 584

moy. 1995-2004 : 930

moy. 2005-2014 : 535

moy. 2015-2022 : 409

moy.max : 1662 (13/14)

Effectifs annuels :

moy. 1970-2022 : 439

moy. 1995-2004 : 698

moy. 2005-2014 : 388

moy. 2015-2022 : 316

moy.max : 1330 (2014)

Tendances

Europe :

70 ↘ 21

nationale :

-

Baie de Saint-Brieuc :

97 ↗ 05 → 22

source :

Wetlands International




BirdLife

RNN Baie de Saint-Brieuc

Vanneau huppé



Vanellus vanellus

Evolution des effectifs du Vanneau huppé en baie de Saint-Brieuc au cours de l'année.
Tendance sur la période 1970-2022.
 (non figuré une donnée de 8000 ind. en janvier 1996
 et une donnée de 6500 ind. en février 1996)



Indice de variation des effectifs calculé à partir des données Wetlands National et en baie de Saint-Brieuc.
 (L'indice 1 est fixé par la moyenne des effectifs sur la période 2000-2021).

Evolution des effectifs du Vanneau huppé en baie de Saint-Brieuc pour la période 1987-2022, à partir des données des comptages Wetlands effectués à la mi-janvier.



Evolution des effectifs moyens du Vanneau huppé en baie de Saint-Brieuc pour la période 1996-2022, établie à partir des données des comptages mensuels.